


COVID-19 疫苗接种决策树

初始接种系列




¹ CDC 将以下人员定义为免疫功能低下：

- 因为血液系统肿瘤或癌症一直接受主动抗癌治疗
- 接受过器官移植，目前正在服用药物抑制免疫功能
- 过去 2 年内接受过干细胞移植或者正在服用药物抑制免疫功能
- 中度或重度原发性免疫缺陷性疾病（例如 DiGeorge 综合征、Wiskott-Aldrich 综合征）
- 晚期或未经治疗的 HIV 感染
- 主动接受大剂量皮质类固醇或其他可能抑制免疫反应的药物治疗

² 初始接种系列剂量如下：

- 辉瑞 0.3 毫升
- 莫德纳 0.5 毫升
- 强生 0.5 毫升

³ 免疫功能低下的人员应考虑以下疫苗加强剂量建议。



⁴ 潜在疾病是指让 COVID-19 感染者陷入重症风险的疾病。如需最新列表，请点击[此处](#)访问 CDC 网站。

⁵ 频繁接触包括机构性或职业性接触 SARS-CoV-2 病毒。包括但不限于医疗保健人员、长期护理设施内的居民、集体住宅居民、被监禁人员以及[从事必要工作的雇员](#)。

⁶ 疫苗加强剂量如下：

- 辉瑞 0.3 毫升
- 莫德纳 0.25 毫升
- 强生 0.5 毫升

⁷ 有关如何选择加强剂量疫苗品牌的更多信息，请参阅 [CDC clinical considerations \(CDC 临床考量\)](#)。

有关疫苗加强剂量资格的其他问题，请参阅 [CDC guidelines \(CDC 指南\)](#)。