


# HATUA ZA UAMUZI WA CHANJO YA COVID-19

## Mkondo wa Msingi




<sup>1</sup> CDC inafafanua kingamaradhi dhaifu kama watu ambao:

- Wamekuwa wakipata tiba ya saratani kwa ajili ya vivimbe au saratani za damu
- Wamefanyiwa upandikizaji wa kiungo na wanameza dawa ili kukandamiza mfumo wa kingamaradhi
- Wamefanyiwa upandikizaji wa chembechembe za msingi ndani ya miaka 2 au wanameza dawa ili kukandamiza mfumo wa kingamaradhi
- Wana upungufu wa kinga mwilini wa wastani au mbaya (kama vile dalili za DiGeorge, dalili za Wiskott-Aldrich)
- Maambukizi ya juu au yasiyotibiwa ya VVU (HIV)
- Wana tiba ya corticosteroid ya dozi ya juu au dawa zinazoweza kukandamiza mkabiliano wa kinga yako

<sup>2</sup> Viwango vya mkondo wa msingi ni kama vifuatavyo:

- Pfizer 0.3mL
- Moderna 0.5mL
- Janssen 0.5mL

<sup>3</sup> Watu walio na kingamaradhi dhaifu huzingatia mapendekezo yafuatayo ya dozi ya kiimarishaji.



<sup>4</sup>Maradhi ya muda mrefu ni yale yanayomweka mtu kwenye hatari ya juu ya kushuhudia ugonjwa mbaya akipata COVID-19. Kwa orodha iliyosasishwa, tafadhali tembelea tovuti ya CDC [hapa](#).

<sup>5</sup>Mfichuo wa hatari wa mara kwa mara ni pamoja na mfichuo wa asasi au kazi kwa SARS-CoV-2. Hii ni pamoja na lakini si tu watoa huduma za afya, wakazi wa huduma za muda mrefu, wakazi wa makao ya kundi, watu waliofungwa jela na [waajiriwa wa huduma muhimu](#).

<sup>6</sup>Viwango vya dozi ya kiimarishaji ni kama vifuatavyo:

- Pfizer 0.3mL
- Moderna 0.25mL
- Janssen 0.5mL

<sup>7</sup>Kwa maelezo zaidi kuhusu kuchagua chapa ya kutumia kwa ajili ya dozi ya kiimarishaji, tafadhali tazama [mazingatio ya matibabu ya CDC](#).

Kwa maswali zaidi, tafadhali rejelea [miongozo ya CDC](#) kuhusu ustahiki wa kiimarishaji cha chanjo.