

## ☑ 保持最新 COVID-19 疫苗接种状态

CDC（疾病预防控制中心）建议人们保持最新 COVID-19 疫苗接种状态，包括为免疫功能低下的人提供额外剂量疫苗或者定期接种加强剂量。中度或重度免疫功能低下人员应接种额外剂量的初始疫苗和加强疫苗。

### 何人有资格接种 COVID-19 疫苗？

在美国，所有年满 5 岁人员均有资格接种初始 COVID-19 疫苗系列。此外，所有年满 5 岁的中度或重度免疫功能低下人员都有资格接种额外剂量的初始系列和第 3 剂 COVID-19 疫苗。

自 2021 年 1 月 5 日起，所有已完成 COVID-19 初始系列疫苗接种的 12 岁以上（含）人员均有资格接种疫苗加强剂量（满足与初始系列接种的间隔时间后）。

### 推荐使用哪些 COVID-19 疫苗？

CDC 建议所有人员均接种 mRNA（辉瑞或莫德纳）COVID-19 疫苗的初始系列剂量和加强剂量。建议接种强生初始剂量疫苗的 18 岁以上（含）人员于两个月后接种 mRNA 疫苗加强剂量。

请咨询您的医疗保健人员，以确定哪种 COVID-19 疫苗最合适。

### 哪些人被视为免疫功能低下？

存在以下情况的人员被认为中度或重度免疫功能低下：

- 因为血液系统肿瘤或癌症一直接受主动抗癌治疗
- 接受过器官移植，目前正在服用药物抑制免疫功能
- 过去两年内接受过干细胞移植或者正在服用药物抑制免疫功能
- 中度或重度原发性免疫缺陷性疾病（例如 DiGeorge 综合征、Wiskott-Aldrich 综合征）
- 晚期或未经治疗的 HIV 感染
- 主动接受大剂量皮质类固醇或其他可能抑制免疫反应的药物治疗

人们应该与自己的医疗保健人员讨论自身健康状况，以了解额外初级疫苗剂量是否合适。

## 保持最新状态：5-11 岁儿童

### 初始接种系列：

所有 5-11 岁儿童都有资格接种两剂初级剂量系列辉瑞 COVID-19 疫苗，间隔至少 21 天。此外，所有中到重度免疫功能低下的 5-11 岁儿童都有资格接种额外剂量的初始系列和第 3 剂 COVID-19 疫苗（与第二剂间隔 28 天）。

### COVID-19 疫苗加强剂量：

5-11 岁儿童目前没有资格接种 COVID-19 疫苗加强剂量。

## 保持最新状态：12-17 岁青少年

### 初始接种系列：

所有 12-17 岁青少年都有资格接种两剂初级剂量系列辉瑞 COVID-19 疫苗，间隔至少 21 天。此外，所有中到重度免疫功能低下的 12-17 岁青少年都有资格接种额外剂量的初始系列和第 3 剂 COVID-19 疫苗（与第二剂间隔 28 天）。

### COVID-19 疫苗加强剂量：

12-17 岁青少年，包括免疫功能低下者，均有资格在完成初级系列接种五个月后接种辉瑞 COVID-19 疫苗加强剂量。

## 保持最新状态：18 岁以上成年人 辉瑞疫苗初级系列接种人员

### 初始接种系列：

所有 18 岁以上（含）成年人都有资格接种两剂初级剂量系列辉瑞 COVID-19 疫苗，间隔至少 21 天。此外，所有中到重度免疫功能低下的 18 岁以上（含）成年人均有资格接种额外剂量的初始系列和第 3 剂 COVID-19 疫苗（与第二剂间隔 28 天）。

### COVID-19 疫苗加强剂量：

18 岁以上（含）成年人，包括免疫功能低下者，均有资格在完成初级系列接种五个月后接种 COVID-19 疫苗加强剂量\*。

\*尽管首选 mRNA 疫苗，但在[某些情况下可以考虑接种强生 COVID-19 疫苗](#)。

## 保持最新状态：18 岁以上成年人 莫德纳疫苗初级系列接种人员

### 初始接种系列：

所有 18 岁以上（含）成年人都有资格接种两剂初级剂量系列莫德纳 COVID-19 疫苗，间隔至少 28 天。此外，所有中到重度免疫功能低下的 18 岁以上（含）成年人均有资格接种额外剂量的初始系列和第 3 剂 COVID-19 疫苗（与第二剂间隔 28 天）。

### COVID-19 疫苗加强剂量：

18 岁以上（含）成年人，包括免疫功能低下者，均有资格在完成初级系列接种五个月后接种 COVID-19 疫苗加强剂量\*。

\*尽管首选 mRNA 疫苗，但在某些情况下可以考虑接种强生 COVID-19 疫苗。

## 保持最新状态：18 岁以上成年人 强生疫苗初级系列接种人员

### 初始剂量：

所有 18 岁以上（含）成年人均有资格接种单剂初级剂量强生\*COVID-19 疫苗。接种强生疫苗初级剂量的 18 岁以上（含）中到重度免疫功能低下的成年人没有资格接种额外第 2 剂量。

### COVID-19 疫苗加强剂量：

18 岁以上（含）成年人，包括免疫功能低下者，均有资格在完成初级系列接种两个月后接种 COVID-19 疫苗加强剂量\*。

\*尽管首选 mRNA 疫苗，但在某些情况下可以考虑接种强生 COVID-19 疫苗。

## 何处接种疫苗

您可以在 NDDoH [Vaccine Locator（疫苗定位器）](#) 网页获得附近 COVID-19 疫苗提供方和诊所的相关信息。您也可以拨打 NDDoH 热线 1.866.207.2880 获得帮助。