

## Mantenerse actualizado sobre las vacunas contra la COVID-19

Los CDC recomiendan que las personas se mantengan al día con sus vacunas contra la COVID-19, incluidas las dosis adicionales para personas inmunodeprimidas o dosis de refuerzo en puntos de tiempo regulares. Las personas con inmunodepresión moderada o grave deben recibir una vacuna primaria adicional y una vacuna de refuerzo.

### ¿Quién es elegible para las vacunas contra la COVID-19?

Todas las personas mayores de 5 años son elegibles para recibir una serie primaria de la vacuna contra la COVID-19 en los Estados Unidos. Además, todas las personas con inmunodepresión moderada a grave y mayores de 5 años son elegibles para recibir una dosis adicional (3.<sup>ra</sup>) de la vacuna contra la COVID-19 junto con su serie primaria.

A partir del 5 de enero de 2021, todas las personas mayores de 12 años que hayan completado su serie primaria de una vacuna contra la COVID-19 son elegibles para una dosis de refuerzo una vez que hayan alcanzado el intervalo de tiempo que depende de la serie primaria recibida.

### ¿Qué vacunas contra la COVID-19 se recomiendan?

Los CDC recomiendan que todas las personas reciban una serie primaria y una dosis de refuerzo de una vacuna contra la COVID-19 de ARNm (Pfizer o Moderna). Se recomienda que las personas mayores de 18 años que recibieron una dosis primaria de Janssen (Johnson & Johnson) reciban una dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm dos meses después de la dosis primaria.

Hable con su proveedor de atención médica para decidir qué vacuna contra la COVID-19 es mejor para usted.

### ¿Quién se considera inmunodeprimido?

Se considera que las personas están moderada o gravemente inmunocomprometidas si:

- Han estado recibiendo tratamiento oncológico activo para tumores o cánceres de la sangre
- Han recibido un trasplante de órgano y está tomando medicamentos para inhibir el sistema inmunitario
- Han recibido un trasplante de células madre en los últimos dos años o está tomando medicamentos para inhibir el sistema inmunitario
- Tienen inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge, el síndrome de Wiskott-Aldrich)
- Tienen infección por VIH avanzada o no tratada
- Están en tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas u otros medicamentos que pueden suprimir su respuesta inmunitaria

Las personas deben hablar con su proveedor de atención médica sobre su condición médica y si recibir una vacuna primaria adicional es apropiado para ellos.

### **Manténgase actualizado: niños de 5 a 11 años**

**Serie primaria:**

Todos los niños de 5 a 11 años son elegibles para una serie primaria de dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech con al menos 21 días de diferencia. Además, todos los niños de 5 a 11 años de edad que estén inmunodeprimidos de moderados a graves son elegibles para un dosis adicional (3.<sup>ra</sup>) junto con su serie primaria 28 días después de su segunda dosis.

**Dosis de refuerzo:**

Los niños de 5 a 11 años actualmente no son elegibles para una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19.

### **Manténgase actualizado: adolescentes de 12 a 17 años**

**Serie primaria:**

Todos los adolescentes de 12 a 17 años son elegibles para una serie primaria de dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech con al menos 21 días de diferencia. Además, todos los niños de 12 a 17 años de edad que estén inmunodeprimidos de moderados a graves son elegibles para una dosis adicional (3.<sup>ra</sup>) junto con su serie primaria espaciada 28 días después de su segunda dosis.

**Dosis de refuerzo:**

Los adolescentes de 12 a 17 años, incluidos aquellos inmunocomprometidos, son elegibles para una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer cinco meses después de completar su serie primaria.

### **Manténgase actualizado: adultos mayores de 18 años para los que recibieron la serie primaria de Pfizer**

**Serie primaria:**

Todos los adultos mayores de 18 años son elegibles para una serie primaria de dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech con al menos 21 días de diferencia. Además, todos los adultos mayores de 18 años que están inmunocomprometidos de moderados a graves son elegibles para una dosis adicional (3.<sup>ra</sup>) junto con su serie primaria 28 días después de su segunda dosis.

**Dosis de refuerzo:**

Los adultos mayores de 18 años, incluidos aquellos inmunocomprometidos, son elegibles para una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19\* cinco meses después de completar su serie primaria.

\*Aunque se prefieren las vacunas de ARNm, la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson [se puede considerar en algunas situaciones](#).

**Manténgase actualizado: adultos mayores de 18 años**  
para los que recibieron una serie primaria de Moderna

**Serie primaria:**

Todos los adultos mayores de 18 años son elegibles para una serie primaria de dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna con al menos 28 días de diferencia. Además, todos los adultos mayores de 18 años que están inmunocomprometidos de moderados a graves son elegibles para una dosis adicional (3.<sup>ra</sup>) junto con su serie primaria 28 días después de su segunda dosis.

**Dosis de refuerzo:**

Los adultos mayores de 18 años, incluidos aquellos inmunocomprometidos, son elegibles para una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19\* cinco meses después de completar su serie primaria.

\*Aunque se prefieren las vacunas de ARNm, la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson [se puede considerar en algunas situaciones](#).

**Manténgase actualizado: adultos mayores de 18 años**  
para los que recibieron una dosis primaria de Johnson y Johnson

**Dosis primaria:**

Todos los adultos mayores de 18 años son elegibles para una serie primaria de dosis única de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson\*. Los adultos de 18 años o más con inmunodepresión moderada a grave que recibieron una dosis primaria de Johnson & Johnson NO son elegibles para una dosis adicional (2.<sup>da</sup>).

**Dosis de refuerzo:**

Los adultos mayores de 18 años, incluidos aquellos inmunodeprimidos, son elegibles para una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19\* dos meses después de completar su primera dosis.

\*Aunque se prefieren las vacunas de ARNm, la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson [se puede considerar en algunas situaciones](#).

## Dónde vacunarse

Puede encontrar información sobre proveedores y clínicas de vacunas contra la COVID-19 cerca de usted en el [Localizador de vacunas contra la COVID-19](#) en la página de NDDoH. También puede comunicarse con la línea directa de NDDoH al 1.866.207.2880 para obtener ayuda.